

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne - Česká rep.: Český kras, bývalý vápencový lom Paraple 1 km SV Sv. Jana p. Skalou, zastíněný vápencový kámen, 380-400 m n.m., 29.5.1997 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. V seznamu ohrožených mechů ČR (Váňa 1995) je druh hodnocen jako kriticky ohrožený.

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. - Česká rep.: Moravsko-Slezské Beskydy, obec Písečná, v údolí potůčku Kotelnice, 550 m n.m., 2.4.1997 leg. V.Plášek, OP. Kriticky ohrožený druh (sensu Váňa 1995), ve Slezských Beskydách dosud nesbírán.

Jungermannia caespiticia Lindenb. - Česká rep.: Krkonoše, údolí Bílého Labe mezi Jeleními Boudami a chatou u Bílého Labe, na čerstvě obnažené šterkovité zemi, 910 m n.m., 14.6.1997 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. V seznamu ohrožených jätrovek ČR (Váňa 1993) druh hodnocen jako kriticky ohrožený.

Scapania aspera Bernet - Česká rep.: Moravský kras, Ochoz u Brna, na vápencové skále poblíž potoka Řička, 400 m n.m., 24.7.1997 leg. V.Plášek, OP. Nová lokalita této kriticky ohrožené jätrovky v Moravském krasu.

Caloplaca flavorubescens (Leight.) Th.Fr. - Slovenská rep. (7674c): Tríbeč, upätie kopca Lupka JV obce Dražovce, na odpadkovom molítane, 150 m n.m., 5.11.1997 leg. A.Lackovičová.

Gyalecta geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. - Česká rep. (6664d): Malhostovice u Tišnova, vápencový pahorek "Drásovský kopec", 1 km J obce, 320 m n.m., IX.1997. - Česká rep. (6963b): Rokytná u Morav. Krumlova, slepencové skály "Tábor" 0,5 km JV obce, 300 m n.m., X.1997. Vápnomilný horský druh. V obou případech na kolmých skalách severní orientace v porostu *Sesleria albicans*. Roste na hlině pod trsy slezineků a ve spárách skal.

Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vainio) Bitter - Česká rep. (7161a): Čížov (distr. Znojmo), vápencová skála "Sloní hřbet" v údolí Klapera potoka 2 km J obce, 320 m n.m., IV.1995. - Česká rep. (6963d): Morav. Krumlov, slepencová stráž 0,2 km SV kaple sv. Floriána, na skalce s *Fumana procumbens*, 270 m n.m., X.1997. - Česká rep. (6963b): Rokytná u Morav. Krumlova, slepencové skály "Baby" na levém břehu Rokytné 1 km V obce, 250 m n.m., X.1997. Na slepencích se vyskytuje na členitých skalách převážně jižní orientace, avšak v biotopech bez přímého oslunění na SZ resp. SV orientovaných stěnách terénních zářezů.

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. - Česká rep. (6448a): NPR „Míšovské buky“ (ca 3 km J Míšova), na kůře buku, 740 m n.m., 16.10.1997 leg. Š.Bayerová. Kriticky ohrožený druh. Na blízké lokalitě „Pod Maráskem“ sbíral tento druh již A.Hilitzer (Hilitzer 1929).

ZPRÁVY ZE SEKCE

Dne 16.5. 1997 se konala exkurze do okolí Louňovic (súťe na svazích IXY Luč, údolí Vltavy) pro 13 studentů BF JU, vedlí J.Liška a A.Lepšová.

Ve dnech 7.-12.7. proběhla ve vzdělávacím středisku Chaloupky, nedaleko Okříšek akce Hurá z lavic do přírody určená pedagogické veřejnosti. Jeden den byl věnován mechorostům. Vedení dopolední exkurze a odpoledního mikroskopického praktika se ujal I.Novotný za pomoci S.Kubešové. Byly demonstrovány převážně běžnější druhy. Navštívili jsme louky, intravilán obce Nová Brtnice, smřčinu s menším potůčkem a mokřinou. Akce se zúčastnilo 20 osob ve věku 4 měsíce - 65 let.

S.Kubešová a I.Novotný