

Novou zkratku *not.* (zapsal, zaznamenal) využijeme mnohem častěji než *leg.* (sbíral), neboť obyčejné druhy obvykle nedokladujeme (abychom si nepřidělávali práci a zároveň také nezatěžovali zbytečně herbáře a sbírky); vzácné taxony zase nesbíráme proto, abychom sběrem popř. neohrozili jejich existenci.

Nakonec poznamenávám, že potřebu zkratky pro „zapsal“ nebo „zaznamenal“ nepociťujeme jen my u nás, nýbrž i jiní badatelé v zahraničí. Patří k nim např. i chorvatská mykoložka ze Záhřebov dr. M. Tortic, která mi nedávno o tomto problému psala a stěžovala si, že pro jen zaznamenané (ne sebrané) taxony neexistuje žádná vhodná latinská zkratka a zkratku *leg.* nemůžeme použít pro ty četné případy, kdy exsikát nepofizujeme. I tato skutečnost podporuje opravdovou potřebu zavedení nové zkratky *not.*

Tento článek byl zároveň otištěn v Mykologických listech (71: 18-20, 1999) a ve Zprávách České botanické společnosti (34: 121-122, 1999).

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. – Česká rep.: Žatec, Libočany, na padlém, mechem hustě porostlém kmeni (*Populus* sp.) na pravém břehu Olše asi 1 km S obce, ca 210 m n.m., 27.2.2000 leg. L. Němcová, herb. L. Němcová. – Labské pískovce, paseka u Mlýnské cesty asi 0,9 km SZ obce Mezné, ca 280 m n.m., 30.7.2000 leg. Z. Hradílek, herb. Z. Hradílek, BRNM. Další lokalita invazního druhu mechu.

Fissidens osmundoides Hedw. – Česká rep.: Šumava: Křišťanovice, rašelinná louka na JV okraji Křišťanovického rybníka asi 6 km JZ Prachatic, 790 m n.m., 14.4.2000 leg. J. Kučera, herb. J. Kučera. – Ralsko-bezděžská tabule, obec Staré Splavy, přírodní rezervace Sluneční dvůr SZ obce (společně s *Tomenthypnum nitens* a *Hamatocaulis vernicosus*), asi 260 m n.m., 12.8.2000 leg. F. Müller, herb. F. Müller (Technische Universität Dresden). Nové lokality u nás vzácného reliktního mechu.

Orthodontium lineare Schwaegr. – Česká rep.: Vsetínské vrchy, Pulčinské skály u Horní Lidče, les v SZ svahu vrchu Hradisko 1,3 km S obce Pulčín, na lesní půdě v místě zvaném Izby (skalní město), 740 m n.m., 13.9.2000 leg. M. Kašparová, det. Z. Hradílek, VM (Muzeum Valašské Meziříčí), herb. Z. Hradílek. – Hrubý Jeseník, Rejvíz, Velké mechové jezírko 1,3 km JZ obce Rejvíz, vlhká půda mezi kořeny borovice blatky u V břehu jezírka, ca 770 m n.m., 2.11.2000 leg. Z. Hradílek et M. Zmrhalová, herb. Z. Hradílek, herb. M. Zmrhalová. – Drahanská vrchovina, svahy vrchu Durana, 1,5 km VJV obce Úsobrno, v bukovém lese, na zemi nedaleko lesního průseku, 480-600 m, 24.7.2000, det. S. Kubešová, leg. S. Kubešová et I. Novotný. Tradiční representant rubriky pro svůj invazní charakter šíření (na Moravě dosud poměrně vzácný). Nález na Vsetínsku představuje dosud nejvýhodnější situovanou lokalitu v ČR!

Orthotrichum patens Bruch ex Brid. – Česká rep.: Česká Kamenice, údolí Kamenice asi 1 km Z města, na borce vrby v louce asi 100 m od břehu, asi 280 m n.m., 28.9.2000 leg. L. Němcová, herb. L. Němcová. Nález ohroženého druhu mechu (sensu Váňa 1995).

Seligeria campylopoda Kindb. – Česká rep.: Džbán, NPR Pochvalovská stráž poblíž obce Kozojedy, 460 m n.m., 5.5.2000 leg. R. Pohlová, herb. R. Pohlová. Nález kriticky ohroženého druhu mechu (sensu Váňa 1995). Dosud byl tento druh v ČR nalezen jen na další lokalitě na Džbánu (Mlý), třech lokalitách v Krkonoších a v Hostýnských vrších.