

subulata Hedw.

truncata (Hedw.) Mitt.in Godm.

[Pozn.: P - *T. convoluta* (Brid.) Pilous = *Tortula atrovirens*, P - *T. obtusifolia* Schleich. = *Tortula obtusifolia*, P - *T. velenovskyi* Schiffner = *Hilpertia velenovskyi*]

Trichostomum Bruch.

brachyodontium Bruch in F.Müll.

caespitosum (Bruch ex Brid.) Jur.

crispulum Bruch in F.Müll.

tenuirostre (Hook. et Tayl.) Lindb.

[Pozn.: *T. triumphans* De Not. = *Weissia triumphans*, *T. brevifolium* Sendtner = *T. crispulum*, *T. viridulum* Bruch = *T. crispulum*, *T. mutabile* Bruch = *T. brachyodontium*]

Weissia Hedw.

brachycarpa (Nees et Hornsch.) Jur.

condensa (Voit) Lindb.

controversa Hedw.

fallax Sehm.

levieri (Limpr.) Kindb.

longifolia Mitt.

rostellata (Brid.) Lindb.

rutilans (Hedw.) Lindb.

squarrosa (Nees et Hornsch.) C.Müll.

triumphans (De Not.) Hill

wimmeriana (Sendt.) B.S.G.

Literatura

Corley M.F.V. & Crundwell A.C. (1991): Additions and amendments to the mosses of Europe and the Azores. - *J. Bryol.*, Oxford etc., 16: 337-356.

Corley M.F.V., Crundwell A.C., Düll R., Hill M.O. & Smith A.J.E. (1981): Mosses of Europe and the Azores; an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. - *J. Bryol.*, Oxford etc., 11: 609-689.

Pilous Z. & Duda J. (1960): Klíč k určování mechorostů ČSR. - ČSAV, Praha.

Podpěra J. (1954): *Conspectus Muscorum Europaerorum*. - ČSAV, Praha.

Soldán Z. (1994): Přehled nově zjištěných druhů mechů na území České a Slovenské republiky po roce 1960. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.*, Praha, 28(1992): 55-68.

Zander R.H. (1993): Genera of the Pottiaceae: mosses of harsh environments. - *Bull. Buffalo Soc. Natur. Sci.*, Buffalo, N.Y., 32: 1-378.

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Anacamptodon splachnoides Brid. - Česká rep. (VQ2): Šumava, Srnčí vrch asi 8 km J Volar, ve vlhké štěrbině borky starého buku, ca 800 m n.m., c. spor., 29.9.1994 leg. Z.Palice, det. V.Tíkalová, herb. Z.Palice. Vzácny mech, dosud znám ze Šumavy pouze z Boubína.

Bryum bicolor Dicks. - Česká rep. (VQ3): Vlašimská pahorkatina, okraj polní cesty ca 1 km J Heřmaniček, 520 m n.m., 11.11.1994 leg. Z.Soldán et L.Peterková, herb. Z.Soldán, PRC. Nepříliš častý, zřejmě však spíše přehlížený druh sešlapávaných okrajů cest.

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. - Česká rep. (VS4): Českolipsko, obec Veselí, ca 300-400 m SV vrcholu Jeleního vrchu (k. 319), břeh lesní cesty, steril., 15.6.1994 leg. M.Zmrhalová, det. L.Němcová, herb. M.Zmrhalová. V pořadí třetí zjištěná lokalita (Borkovická blata u Soběslavi a Bílichovský potok poblíž Loun - cf. Bryonora 11: 13) tohoto invazního, ze západní Evropy se šířícího druhu v České republice.

Frullania fragilifolia (Tayl.) Gott. et al. - Německo (UQ4): Böhmerwald, Medvědí hřbet pod Roklanem, na pahýlu mrtvého buku pouze asi 1 m od státní hranice s ČR(!), ca 1120 m n.m. 1994 leg. Z.Palice, det. J.Kučera, herb. Z.Palice. V České republice byla tato játrovka nalezena pouze jedenkráté J.Velenovským na šumavském Debrníku v r. 1901.

Orthodontium lineare Schwaegr. - Česká rep. (UQ2): Šumava, Prášílské jezero, 1100 m n.m., steril., 30.8.1993 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Další údaj expanzivního druhu mechu ze Šumavy.

Scapania paludicola Loeske & K.Müll. - Česká rep. (UQ2): Šumava, pramenná oblast Rachelbachu pod Medvědí horou, 1160 m n.m., 13.8.1994 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Tato játrovka byla dosud nalezena v jižní polovině Čech jen u Starého jezera poblíž Chlumu u Třeboně (Šmardův sběr z r. 1945).

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. - Česká rep. (VS4): Českolipsko, lokalita Shnilé louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy, ca 250 m n.m., c. spor., 15.6.1994 leg. M.Zmrhalová, herb. M.Zmrhalová. Kriticky ohrožený druh ř. *Dicranaceae*; ze severních Čech je doložen pouze sběry z minulého století.

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke - Česká rep. (5446c): Krušné hory, obec Boleboř ca 7 km S Chomutova, ca 600 m n.m., 10.9.1988 leg. J.Halda, herb. J.Halda. Vzácnější druh dutohlávky z oblasti prakticky bez údajů o lišejnících z posledních let.

Cladonia rei Schaerer - Česká rep. (5663d): Orlické hory, obec Sedloňov ca 4 km SZ Deštného, ca 680 m n.m., 15.8.1988 leg. J.Halda, herb. J.Halda. Vzácnější druh dutohlávky z oblasti prakticky bez údajů o lišejnících z poslední let.

Imadophila ericetorum (L.) Zahlbr. - Česká rep. (6947a): Šumava, Modrava, na pařezu u cesty mezi Horskou Kvildou a Antiglem v údolí Hamerského potoka, ca 1000 m n.m., 16.7.1994 leg. B.Wagner, herb. B.Wagner. Vzácnější a ohrožený druh lišejníku.

ZPRÁVY ZE SEKCE

Příspěvky na r. 1995:

Během jednání na 7. bryologicko-lichenologických dnech v Jeseníkách odsouhlasilo plénum diferencované příspěvky na příští rok: základní příspěvek zůstává ve stejné výši jako letos, tj. 40,- Kč, pro členy CBS platí snížený příspěvek na částku 20,- Kč. Prosíme proto o laskavé zaplacení přiložené složenky s odpovídajícím obnosem. Předem děkujeme za brzké vyřízení, které nám ušetří zbytečnou korespondenci při urgenci.