

- Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske 3V. - *Philonotis calcarea* (B.S.G.) Schimp. 2B, 2V, 5B. - *P. fontana* (Hedw.) Brid. 10B. - *Plagiobryum zierii* (Hedw.) Lindb. 9J. - *Plagiomnium elatum* (B. & S.) T. Kop. 5J, 8J. - *Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr. 3B, 8J. - *Plagiothecium curvifolium* Schlieph. ex Limpr. 3V. - *P. laetum* B.S.G. 3V. - *P. nemorale* (Mitt.) Jaeg. 1B, 8J. - *Platygyrium repens* (Brid.) B.S.G. 3V. - *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. 1B, 9J. - *P. longicollis* (Hedw.) Lindb. 3B. - *P. nutans* (Hedw.) Lindb. 3V. - *P. wahlenbergii* var. *calcarea* (Warnst.) Warb. 9J. - *Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G.L. Smith 3V. - *Pseudoleskeella catenulata* (Schrad.) Kindb. 3B, 3V, 6J. - *P. nervosa* (Brid.) Nyholm 6V. - *Pterigynandrum filiforme* Hedw. 2V. - *Rhynchostegium murale* (Hedw.) B.S.G. 2V. - *R. riparioides* (Hedw.) Card. 2V. - *Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst. 3V. - *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske 2V, 3V, 7V. - *Schistidium apocarpum* (Hedw.) B.S.G. 1V, 3V. - *Seligeria domniana* (Sm.) C. Müll. 3B, 5B, 5J. - *S. trifaria* (Brid.) Lindb. 8B. - *Tetraphis pellucida* Hedw. 1V, 3V. - *Thuidium philibertii* Limpr. 2V. - *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr. 2V, 3V, 7V, 8J. - *Tortula intermedia* (Brid.) De Not. 3V. - *T. norvegica* (Web.) Wahlenb. & Lindb. 9J. - *T. ruralis* (Hedw.) Gärtn., Meyer & Scherb. 5B.

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Conardia compacta (C.Müll.) Robins. - Česká rep.: Rýchory, Horní Maršov, Vodovodní údolí, na zemi pod balvanem, ca 610 m n.m., VII.1993 leg. P.Hájek, herb. P.Hájek. Velmi vzácný mech zahrnutý do kategorie kriticky ohrožených druhů (cf. Vaňa 1995).

Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. - Česká rep.: Praha, Radotínské údolí, Černá rokle, výslunné vápencové skalky pod obcí Kosoř zvané „Sudy“, c.spor., ca 330 m n.m., 13.4.1996 leg. Z.Soldán et B.Buryová, 8.5.1996 leg. J.Váňa, herb. Z.Soldán, herb. B.Buryová et herb. J.Váňa. Potvrzení výskytu mediteránního druhu mechu na známé lokalitě po téměř padesáti letech; poslední sběr pochází z r.1949 (R.Vaněk)

Dicranum tauricum - Česká rep.: Orlické hory, Říčky, na borce, IX.1993; Hradec Králové, rybník Biříčka, na borce, VII.1994; Hradec Králové, Sitovka, na borce, X.1994. Omnia leg. P.Hájek, herb. P.Hájek. Dle známých lokalit nepříliš hojný druh, avšak s velkou pravděpodobností do jisté míry přehlížen.

Fossombronía foveolata Lindb. - Česká rep.: Třeboňská pánev, v pískovně asi 2 km SSZ obce Borkovice, 420 m n.m., 21.10.1995 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Dosti vzácná játrovka okrajů rybníků a rašelinných půd především v nižších polohách. V blízkosti zmíněné lokality - mezi obcemi Zálší a Borkovice - ji v r. 1941 sbíral J.Šmarda.

Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda - Česká rep.: Šumava, Nová Pec, severní svah hory Plechý, ve šterbině mezi balvany v kamenném moři (s *Pinus mugo*), asi 400-500 m SSZ Štifterova pomníku, 1270-1280 m n.m., 14.10.1995 leg. Z.Palice, herb. Z.Palice. Na Šumavě tento arкто-alpínský druh játrovky sbíral pouze Hiltzer (1928) v Jezerní stěně Černého jezera.

Meesia triquetra Aongstr. - Česká rep.: „Domažlice, bahnitá luka pod Kozinovým Újezdem, 2.9.1914 leg. Fr.Maloch“, rev. B.Buryová, PL. Rostlinky tohoto vzácného mechu byly přimíseny do položky druhu *Philonotis fontana* a Malochem také správně určeny. - „Silesia, opp. Vítkov, in pratis turfosis prope pagum Březová, 500 m, 15.8.1957 leg. J.Duda“, det. B.Buryová, OP. Mech přimísen do položky *Philonotis fontana*, autorem sběru na schedě nezminěn.

Orthotrichum alpestre Hornsch. - Slovenská rep.: Veľká Fatra, vrch Rakytov, na buku u salaše asi 1,5 km JV vrcholu, ca 1300 m n.m., 23.6.1994 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Velmi vzácný druh šurpku, dosud znám pouze z jediné moravské lokality (Hrubý Jeseník - sběr z r. 1904) a Slovenska (2 lokality v Nízkých Tatrách -1978, 1985 a Belianské Tatry -1956).

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. - Česká rep.: „východní Čechy, Řežence p. Rychnov (= u Nového Rychnova), 9.1938 leg. J.Jedlička“, det. B.Buryová, BRNM. Rostlinky tohoto vzácného mechu byly přimíseny do položky druhu *Philonotis caespitosa*, autorem na schedě nezminěno.

Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljak. - Česká rep.: Krkonoše, JZZ svah Sněžky, na suti v místě zvaném „Krkonošova rukavice“, ca 1500 m, 20.10.1995 leg. B.Buryová, det. J.Váňa, herb. B.Buryová et herb. J.Váňa. Vzácná subarktcko-alpínská játrovka několikrát sbíraná na Sněžce; poslední sběr pochází z r. 1958 (A.Boros).

Gyalecta jenensis (Batsch.) Zahlbr. - Česká rep. (7149c): Šumava, Volary, Jelení vrchy u Nové Pece, horní portál Schwarzenberského tunelu, ca 900 m n.m., 27.8.1995 leg. B.Gruna et Z.Palice, herb. B.Gruna et Z.Palice. Zajímavý výskyt kalcifytního druhu lišejníku na antropogenní lokalitě, pravděpodobně první údaj ze Šumavy.

Hypocnomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) Choisy - Česká rep. (5560b): Krkonoše, Velká Úpa, Janovy boudy, 880 m n.m., 14.6.1996 leg. F.Krahulec et T.Herben, det. J.Liška, herb. J.Liška. Kuriozní substrát běžného acidofilního lišejníku (na staré visící ponožce!).

ZPRÁVY ZE SEKCE

Určovací praktikum rodu *Didymodon*

Honza Kučera uspořádá v sobotu 2. listopadu 1996 na universitě v Českých Budějovicích určovací praktikum speciálně zaměřené na obsáhlý rod *Didymodon*, s nímž řada z nás při určování pravidelně „zápasí“. Zájemci o účast necht' podají s předstihem přihlášku na adresu: Mgr. Jan Kučera, Biologická fakulta Jihočeské university, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Přihlášení později obdrží další podrobnosti.