

Jak bylo již přislíbeno v minulém čísle Bryonory, navazuje na již uveřejněný výběr lichenologické literatury i výběr citací zahraničních bryologických prací., a to opět za časový úsek let 1985-1988. Kriteria pro výběr prací do této pravidelné rubriky byla také uvedena v minulém čísle. Bylo by však asi vhodné ještě jednou zdůraznit, že uvedení výčet si nečiní nárok na úplnost, zahrnutí by měly být však práce, které mohou členy sekce zajímat; rádi bychom se tedy ještě jednou na Vás obrátili s prosbou o průběžné zasílání takovýchto citací! Z prostorových důvodů musela být tentokrát tato rubrika omezena jen na 2 strany. Budte prosím proto shovívaví, nenajdete-li všechny hledané citace.

zs

- Bačurina G.F. et Melničuk V.M. (1987-1988): Flora mochiv Ukrainskoi RSR. Andrejevi, brijevi, vol. 1,2. - 179 p. (vol.1, 1987); 178 p. (vol.2, 1988), Kiiv.
- Bauer C.R. & Crosby M.R. (1986): Index Muscorum supplementum: 1982-1983. - Taxon 35: 416-439.
- Bornefeld T. (1987): The natural system of the *Marchantiales* based upon cytogenetical and morphogenetical evidences. - Nova Hedwigia 45: 41-52.
- Boyd W.E. (1986): The role of mosses in modern pollen analysis. The influence of moss morphology on pollen entrapment. - Pollen Spores 28: 243-256.
- Buck W.R. & Vitt D.H. (1986): Suggestion for a new families classification of pleurocarpous mosses. - Taxon 35: 21-60.
- Cortini Pedrotti C. (1986): Bibliografia briologica d'Italia. - Webbia 39: 287-353.
- Daniels R.D. & Eddy A. (1985): Handbook of European Sphagna. - 262 p., Utrecht.
- Dull R. (1985): Distribution of the European and Macaronesian mosses (Bryophytina), part. 2. - Bryol. Beitr. 5: 110-232.
- DULL R. (1985): Exkursions-Taschenbuch der wichtigsten Moose Deutschland. - 273 p., Rheurdt.
- Empain A. (1987): Shape of moss leaves: a versatile method of description. - Bull. Jard. Bot. Natur. Belg. 57: 331-361.
- Farr E. R. et Leussink J.A. (1986): Index nominum genericorum (plantarum). Supplementum I. - Regnum Vegetabile 113: 1-126.
- Fife A.J. (1985): A generic revision of the *Funariaceae* (Bryophyta: *Musci*) part. 1. - J. Hatt. Bot. Lab. 58: 149-496.
- Frahm J.-P. (1987): A revised list of the *Campylopus* species of the world. - Bryol. Beitr. 7: 1-117.
- Frahm J.-P. & Frey W. (1987): Moosflora. - 525 p., Stuttgart.
- Frisvoll A.A. (1988): A taxonomic revision of the *Racomitrium heterostichum* group (Bryophyta, *Grimmiales*) in N. and C. America, N. Africa, Europe and Asia. - Gunneria 59: 1-289.
- Galambos I. (1986): Contributions to the Hungarian bryoflora. - Stud. Bot. Hung. 19: 89-92.
- Greene S.W. & Harrington A.J. (1988): The conspectus of bryological literature. Part 1. Index to monographs and regional reviews. - Bryophyt. Biblioth. 35: 1-272.
- Grims F. (1986): Rote Liste gefährdeter Laubmoose (*Musci*) Österreichs. - In: Niklfeld H., Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs, p. 138-151, Wien.
- Grolle R. (1987): A bryohistorical landscape of the German Democratic Republik. - Bryol. Times 43: 5-8.

- Hallingbäck T. & Söderström L. (1987): Sveriges mossor och deras svenska namn - en kommenterad checklista. - Svensk Bot. Tidskr. 81: 357-388.
- Hübschmann A. von (1986): Prodrromus der Moosgesellschaften Zentraleuropas. - Bryophyt. Biblioth. 32: 1-413.
- Inoue H. (1986): Field guide for bryophytes. - 194 p., Tokyo.
- Longton R.E. (1987): The biology of polar bryophytes and lichens. - 391 p., Cambridge.
- Miller N.G. [red.] (1988): Advances in bryology vol. 3. Bryophyte ultrastructure. - 282 p., Berlin & Stuttgart.
- Mischler B.D. (1985): Biosystematic studies of the *Tortula ruralis* complex. 1. Variation of taxonomic characters in culture. - J. Hatt. Bot. Lab. 58: 225-253.
- Murray B.M. (1988): The genus *Andreaea* in Britain and Ireland. - J. Bryol. 15: 17-82.
- Ochyra R. (1986): 6. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. - In: Zarzycki K. & Wojewoda W. [red.], Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, p. 117-128, Warszawa.
- Orbán S. & Podani J. [red.] (1985): Proceedings of the 4th Meeting of the Central and East European Bryologists, Eger, August 12-16. - Abstr. Bot. 9 (suppl.2): 1-244.
- Pierrot R.B. (1985): Contribution à la classification et à la détermination des *Brachythecium* B.S. & G. (Musci) européennes... - Bull. Soc. Bot. Centre-Oest NS 16: 309-319.
- Risse S. (1987): Rhizoidal gemmae in mosses. - Lindbergia 13: 111-126.
- Pócs T., Simon T., Tuba Z. & Podani J. [red.] (1987): Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology, Budapest-Vácraót, Hungary, 5-10 August, 1985. - Symp. Biol. Hungar. 35: 1-547 (part A), 548-902 (part B).
- Rohrer J.R. (1985): A generic revision of the *Hylocomiaceae*. - J. Hatt. Bot. Lab. 59: 241-278.
- Rohrer J.R. (1985): A phenetic and phylogenetic analysis of the *Hylocomiaceae* and *Rhytidiaceae*. - J. Hatt. Bot. Lab. 59: 158-240.
- Rosman-Hartog N. et Touw A. (1987): On the taxonomic status of *Ulotia bruchi* Hornsch. ex Brid., *U. crispa* (Hedw.) Brid. and *U. crispula* Bruch ex Brid. - Lindbergia 13: 159-164.
- Saukel J. (1986): Rote Liste gefährdeter Lebermoose (*Hepaticae*) Österreichs. - In: Niklfeld H., Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs, p. 152-159, Wien.
- Schofield W.B. (1985): Introduction to bryology. - 431 p., New York.
- Smith A.J.E. (1986): Bryophyte phylogeny: fact or fiction? - J. Bryol. 14: 83-89.
- Spence J.R. (1987): A proposal reclassification of *Bryum*, *Anomobryum* and *Brachyhymenium* (Musci, Bryaceae). - J. Bryol. 14: 659-676.
- Stafleu F.A. & Cowan R.S. (1988): Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. Vol. VII: W-Z. - Regnum Veget. 116: 1-653.
- Szwejkowski J. (1986): 5. Czerwona lista watrobowców zagrożonych w Polsce. - In: Zarzycki K. & Wojewoda W. [red.], Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, p. 109-115, Warszawa.
- Vitt D.H., Marsh J.E. & Bovey R.B. (1988): Mosses, lichens & ferns of Northwest North America. - 296 p., Edmonton.
- Zijlstra G. (1987): Nomenclature: report of the committee for Bryophyta. - Taxon 36: 429-431.