

Břestovce – rod *Celtis*

Pomůcka k určování a mapování

Břestovec západní
(*Celtis occidentalis*)



Listy širší, obvykle lysé a hladké, na rubu světle zelené nebo žlutozelené

Listy užší, obvykle oboustranně drsně chlupaté, na rubu výrazně našedlé

Břestovec jižní
(*Celtis australis*)



Zralé plody hnědočervené, neojíněné




Zralé plody modrofialové, ojíněné



Borka od nízkého věku hrubě rozbrázděná, s korkovými výrůstky



Kmen do vysokého věku s hladkou borkou



**Svá pozorování, především zplanělých a volně rostoucích jedinců, nahrávejte do aplikace iNaturalist nebo zasílejte na dendrologie@botanospol.cz.
Děkujeme!**

Břestovce – rod *Celtis*

Pomůcka k určování a mapování

Břestovec západní
(*Celtis occidentalis*)



Listy širší, obvykle
lysé a hladké, na
rubu světle
zelené nebo
žlutozelené

Listy užší, obvykle
oboustranně
drsně chlupaté,
na rubu výrazně
našedlé

Břestovec jižní
(*Celtis australis*)



Zralé plody
hnědočervené,
neojíněné



Zralé plody
modrofialové,
ojíněné



Borka od nízkého
věku hrubě
rozbrázděná, s
korkovými
výrůstky



Kmen do
vysokého věku s
hladkou borkou



**Svá pozorování, především zplanělých a volně rostoucích jedinců, nahrávejte do aplikace iNaturalist nebo zasílejte na dendrologie@botanospol.cz.
Děkujeme!**